中國地勢變遷小史

目錄

除羅紀以後中國的地勢二七	三叠紀光株羅紀中國的地勢	雙達紀至二疊紀(煤紀)中國的地勢	志留紀至泥盆紀中國的地勢二	寒武紀至與陶紀中國的地勢	型爾氏時代中國的地勢
		六	<u>=</u>	1/9	
	-	/)			

11 11/2

中國地勢變遷小史

平應有 們現 截然兩遊與域的沿革政治區: ार्ग 稚 的 事质 時代 豣 究 T: 本書討論的問題是中國地勢的沿革與中國疆域的沿革以及中國內部政治區域 超棚 所謂中國 以這些問題皆然歸歷史家研究至若我們 個專 問 那 門 語, 就是 題, 不 114 待言 ij 與猴子時代相與 任未得妥當的 是我 鬼 地 們 域 域的沿革是人類 裏的 地 4 質家 海陸陵谷之變遷以及氣候之更迭等事實總括這 不遠的舊石器 (paleolithic) 新石器 (neolithic) 訶 以 的 前, 事。 现 發生以後的 在 現在的問題包括人類發生以 畒 稱為 事 地勢的沿革那就是地 ——是人類有了 萷 政 質史 或人 治的 時 代。 (的沿革是 類 紃 此 ήŋ 變 任 織 遷, 以 個 IIӎ 後 方 似 我 źIJ

然 我 IIII (jn) 今天総 pint. 捌 於我 美 存 們們 夘 政 中國這 道 ή'n 잱 till 質家, 卿 Д 大塊 關於 類 By 地皮除了缝 加 他 先還未 們 本 國 /到這個 1世 勢的 個好事的冒險的歐美人外, 2沿革多少2 世 界以 前, 鄁 批 界上 有點 研究聯 已經有了許久許 竟然沒有多少人過問。 合參詳各 多的 處研 治桑之變。 筅 Π' 我們

現在 有如是的 關於我們自己國裏地勢的變遷的知識大半是由這些冒險家得來的他們對於學術上旣然 貢獻現 在我乘這個機會把他們幾位的名字舉出來聊以表示我們威謝的 意思。

五年美國的本潘來 æ Pumpelly) 可算得是頭一 個 地質家到 中國 來研

豝 地 質他所研究的 地域大半限於滿洲蒙古及其他東北各省三年後德國的李希霍芬 $\widehat{\Xi}$

Richthofen) 就到中國來着手他的畢生事業與李希霍芬前後同時有戴衞(A. I)avid)他曾

到過蒙古江西拜橫斷秦嶺東部又有金斯密兒(T. W. Kingsmill)曾在長江流域調查又有卑

克麻兒(A. 'n Bickmore)會由廣東走到漢口他們雖然多少各有點貢獻然而與李希霍芬卻是

不可 [_[] [<u>]</u> 智辞。

一八七七 八〇年間奧國的洛川(L. Loczy)隨着施曾彝 (Széchenyi) 的科 學調宜隊

由長江下游穿過泰蜀人計願沿南山 即 那連山 東北麓進行轉折經過四 ្យា 北 部、 凸 部, 再

南 由雲面的 而到緬甸當時內地風氣不開地方自然不免有仇外的情形據云洛川

(i)

經

過種

西部

秱 困難再數年後有俄國地質家奧勃洛奇(Y. A. Obrutchov)往來於南山數次拜歷四川北部

及蒙古等處一八九八年福德勒 (K. Futterer) 由新疆穿過沙漠復由甘粛過秦嶺出長江下游。 若 其採集的 羅倫斯(Th. Lorenz)若房格商(K. Vogelsang)對於中國東北部及川鄂毗連各屬均各有研 材料 ķij 為可觀惜未加以詳細的分析和編纂其餘若來自林斯(F. Leprince Ringnet)

究尤以羅倫斯在山東調查研究之結果在地層學上最為重要,

분· [1] **延學者在那奧作斷斷續續的調** 杏 豣 究的時候李看霍芬發表了許多關於中國地質的

論女幷陸續發刊他的名著中國(China) 這一部書一直到今天總算是關於中國地 質的 捉 鄆 妻

的 著作, 可惜書末寫完而本人已去世了一九〇三年美國地質家威烈士 (Bailey Willis)和 物拉

龙岸 特色 Blackwelder)受康乃吉學院 (Carnegie Institute) 的委任來中國調 查 地 資他們

西安穿過蒸嶺經過川東鄂西諸屬至宜昌終止他們此次研究的成績以他們所費的時間而 **7**E lrji 調 不過]i, 個月曾到山東遼東又由河北南部入山西東部經過唐縣五台忻州太原、 《西安復由 論, μĵ

算得不少。

季 岩 山岡 西南各省地質的情形大半是由法國人考查出來的最初有湄公河的調查隊繼以

雷克 勒 (Lieclère) 及雷當諸 (Lantenois) 的調查 **隊。** 九一〇年戴芸 一件勒 Depart) 췱 於 集

南 東 部 的 地質, 似乎 **费了一番** 力量外問對於戴 当勒 之為 人, 雖 有 種 糆 物 議, 然而 他 肵 編 'nj 報 佔

竟未可一概輕視。

近 - [-Æ 中來日本人對於古 中國 菂 地質往往 有 所 著逃。 其中! IJ 横 Ш, 矢部、 後藤、 早 坂、 小 野 褚 氏 渚

作 較 多他們的 著作, 大都在東京帝國大學 理科 報告。 我們 可在日本 地 質 學雜誌地質學們及其 他

一二大學的報告中尋出他們的著作這都是不乏有價值的東

西。

以 |Ψ 國 人 研究 中 阈 地 質 īm 郁 成績 न ·考者, 就我 炉 知, 角丁文江、 翁文灝章鴻 釗三 先生 始。 自北

京地 買 調 在 肵 成 M 以 來, 我 們 關 於 中 闼 旭 質 例 知 識, 大有 Н 新 Л 《異之勢但是我 們 中 阅 的 加 積, 如

此 乏大, 考 查 出 來 é'j 結果, 如 此 之少要想 溝 講 抻 國 Jt. 孪 헔 沿革, 詙 何容易 肵 以 我 們 現 在 所 能 討 禰

的, 祇是 僴 簡 而又 簡 Η'n 概略。 至於 詳細 的 情形、 碓 質 的證 據及還有許多其他, 污面, 則 不 能 不 待 找

們自己發憤有為到各處觀察仔細研究。

可 Й 供我 們討論的材料的來源, 大致 如此現在我們應當進一步劃定討論 胃的範圍那? 就是我

終的, új 種 我 上從 地 們 βÜ ŸĬ. 時代當時變更的結果與現今截然不同那 (17) 所 頮)[[那 更越 ŋά 髊 抑是到了一 Ħ'n 討 時纔開始我們 斎, 斷 論 Źĺ, 重要的 成程 言地 的 無一 地勢沿革應從什麼時代起據數十百年來地 廋 71 ďū 定過去 [] 據就在 m 1 ___ 更的 刻不在變更不過變的極慢所以大家都不 論, 地質家考究一地的地質史也只好從那 無極 ľij 特形在 時代白云 這個 大的 原則 一茶異這就是勻和 人類未 和的 的 **%發生以前** 身上。 原 則 然則 時致變更的 就 不能適用了如若從今日起向過去推 我們現在 的學說創於雷俠兒 有許久的時間 質家的觀察我們現在 原因亦必不同那是勻和的變更在 不能不問道 時起比喻歷史家考究一國 知不覺又慘種 與我們現在 (Charles Lyell) 種匀和 種 日 的變更是 地質 擊的 視為千古不 法推到 變更, 掣 <u>.ł.</u> 找 無 無始 的 一定 民族 地球 們 緰 事 無 訍 就

發生 必判決 的時候就是勻和的 腡 於勻和 他的 說適用的範圍自雷俠兒以後學者主張頗不一致極端主張勻和者以爲遞 是 變化開始的時候這種的主張不過是一個主張我們頗難 、判決他 積岩 H 是非,

ή'n

厭

心史祇好從那

國

一民族初有歷史的記

錄那


古生物家和地質家依古代生物繼承的情形及古代地殼極顯著的鼓動將海陸劃分以後直

至今日地球所歷的時間分為若干時代正如歷史家將中國歷史分為若干朝代一般學地質學的,

人大概都知道的這些地質時代就是:

	中生世	_			新生世			
【二疊紀 (Triassic)	株羅紀(Jurassic)	【枯烈紀 (Cretaceous)	(初新(Eocene)	少新(Oligocene)	入新 (Miocene)	更新(Pliocene)	【聲頭 (Pleistocene)	時代名目
	ļ	j	約 30.8	約 8.4	約 6.3	約 2.5	約 1	距現今的年數(以百萬為單位)

中國地勢變遷小史



如未學歷史的人看了周宣王時代羅馬凱撒(Casar)時代等名目一樣沒有什麼意義所以我把 在學過地質學的人看起來有時代的名目便够了然而未會學過地質學的人看了這些名辭,

這些時代到今天大概的年數舉出來這些數日是從合發射元素的礦物推算出來的並不可靠所

以列入表中不過藉以表明年代之長右列的各時代都有特別的嚴層及生物羣以爲代表最要緊

中國 留下 期。 伆 如三 新 北 的 生世之初纔 遗各時代的 葉腕足 方寒武 遺迹極少這是生物學上、 類, 紀 《次序我們人類初發生的時期現在雖不能十分斷定然頂古也不能過 塓 珊瑚類始出現而以三葉爲最盛寒武紀以前, 有哺乳動物發生二疊紀時鳥始生志留紀時魚始生寒武紀初組 前 的巖石 極為發育幷且有一 一地質學 Ŀ, |極有趣 的一 部分未會遭甚 個問 題而 亦當有初 在中國 大的變 更。 北方 級 加 的生物生存 研究 癡 有 花石, 要算 織較完全 於世。 不 È 更新 難 砰, 然而 的 詳 因 爲 動 考

討 襘 的 就 範 我 圍, 們 無妨 現在地質學上的 就從 亞爾 艮紀 知識 的 (判斷) (判断) 末 造 起。 · 變更至遲。 也必不在 亞爾 段紀以 後那: / 麽我們現

仼

他

的

形狀。

來質 學, 旣 無 有 記 問 範 天 載 圍 他, 既 可 說: 他 定關 據 正 我 好 你何以知 於我 老老實實 們 倁 們研 道 道你的甜我 腇 的把 究的 史的 方法, 事 歷 **寶**, 史以 (都不信) 討 爲有 綸 헮 Ĥ) 的 根 史 人 我那 碳, 册 類 不能 的 記 生 載 ---位同 活狀 不 可 略 懑。 事的 你所 態說 加 解釋。 先生生了氣以爲這個 說的 了 我有一 番說完了 騰 史以 位同 前 事, 竹 有 他曾 Л 位 頮 人對 生 赦 聽 活 講 授 扵 粎 A 的 學 態, 起 頮

中國地勢變遷小史

鹼

不

的。 的 矨 分 侑 析, 態。 极 太 现 我 無 懅 撮 在 們 信仰不足與之談我卻 要 找 躭 前 們 知 道 擺 在 出 他 詂 來。 論 ήŢ ęη 用意 中 冷 闽 是要問 我 地 以爲 勢 們 ήÝJ 'n) 沿革以 用 那 推. 什麽 論結 位 案不對 質問 前, ガ 似乎 Æ, 的先生 有 我們所 什 也 燃根 應當 到 7很有道理。 舉的 據。 把 我 使 事實還 找們 們 的 我們 知 方 是事 道 挂 如 胚 說 實。 若將 史以 出 來; 那 井且 Ň 他的 些事 ΉJ 實 疑問 同 人 탉 類 稍 把 11/1 加以 生 我 們 活

推 上某 玂 水 **測當時嚴層停積之處為** 書 表示嚴 樣的 Æ 中的 中有文字圖 攡 不 地質 地 過 生 物藻, 域, 學的 舉 **厢成生之年代并且** 常 淡水中的生物學 人都 有某種的嚴石 畫描寫實事。 最 知道 顯 著之點以求見信於非地質家而抱懷疑 何項地 地層 偶老 堆 有時亦能 心域或為湖 比喻。 各有特 積 由 成 種 層。 種 那 就是我 象地質家所當研究的 表 所以 艐 沼或為 質造 示其成生的 從 戍, 過 們 去時 脚 河床或為海灣或為深洋巖 踏的 地域因 代所 時夾着生 地層, 造成各地層 放是這 態度的 爲 好 像是 物的 大洋的生 遺 些事。 人。 不 質 體。 册 一物藻淺 懐疑不 書。 諸 料 我 層 們 層 加 NJ 中 此 性 知 能見其 就 頏 所 道 類, 鹤, 我們 是 數 火 現 的 不勝 Æ 仼 害 ßŢ 理。 物 化 可 地 时 所 以 球

頁.

以 很 希 望大 家 都 取 種 懐 疑 的 [態度不] 要為 已成的 學說 壓倒。

现 在 我 口 以 上題 講 中國 地 勢 /的沿革] 了。 頭 件 我們 當 注 意 ĦŢ 事, 就是 中 团 丽 地 質 構 造 可 分

爲 南 北 兩 部。 秦嶺 Ш 脈 為天然的 界 限。 秦嶺以北京 稱 爲 挑 部; 秦嶺以 南 稱 爲 南 部。 中 國 揇 部 地 層 的 構

造 較為 椱 雜, 所以 我 們 夘 道 中 圆 蔛 方 地 勢 的 艐 遷 較爲 椱 雜; 扎 方構 造 除 西 北 隅 外, 極 爲 簡

肵

以 Ð 們 知 道 北 部 淮 陸 的 變 運順 爲 鮪 單。

Ų 最 玄古 ŔΊ 髌 石, 石 在 中 國 北 Jj 露 頭甚 多, 在 山 東 東 部, 滿 洲 尤 著。 蒙古山 西、 河 北各處 都 有露 頭。 此

占

削

巖

烈

都 屬 於 這 ----類。 威 秦山]: 一雜嚴 和 韌 īþi 拉 夾着許 克韋 忭 多片 稱 寪 泰山 麻 嚴那 雜 些片 殿。 入 麻 為造 巖, 成泰山: 也 許 분 的 砂 泥質 艐 石, 據勃 的 變 拉 形。 假者 克韋 特 他 們 拍丁 果 軦 娸

原 是 來是否 砂 質 Æ 砂泥, 質 的 變 邆 在 形, 汖 那是在玄古的時代海 **尔定之天即** 줘 是砂 泥等質 陸 早已 卽 分 劃 他 分, 們 種 足 種 地質 塓 表 示 的 玄古時 變 更已 代使 極 照 常 蝕 ĤΊ 進 作 行。 用, 但 然 是 他 m 那 們

「泰 Ш 雜 巖 4 的 各 項 巖 石, 都 經 過 劇 變, 亂 雞 無 章, 曲 某 種 巖 石 的 分 配 m 斷 定 當時 海 陸 的 分 配, 是絕

對 做 不 到 的 事, 所以 /玄古時 代中國的 地 勢 Ŕſ 問 題, 我們現在 儘可不必作無謂的討 論。 以前 所 定討

亞爾艮時代中國的地勢

系。 和 此 勃拉克草特 楋 據 李希霍芬威烈士路 系的 嚴層 ŔŹ 枡 不 究。 中 相 鴵 合。 阅 五台 屬於 氏的調查亞爾長時代所造的農曆在, 亞爾 系 不的嚴層 凡時 代之嚴層。 多屬變有 可分 英殿及泥 寫 闸 綠 系。 中國 J; 在下 脉 巖。 者名 北部 極為 此巖 五台 系居 發育。 石, 都 분 上 III 一者名 砂 ŰŁ 烈 цį 闸 1 變

傸, 牃 疑 義。 他 們 髸 然 成層, 솼 Mi 層 疊往 往 侞 倒 兟 亂。 Ш 财 於 闸 \Box 系 ήŋ 嚴層, 大半 平 列, 蚁 君 傾 計 極

緩。 質多 闖 有 灰或泥 質。 表 **7**: 闸 \Box 系 的嚴 7i, 在 바 國 北 方 的 多在 濮 海 厎 造 成。 據 威 烈 1-1-和 勃 拉 تازا

幸特 私 五台 Ш 附近研究的 結 菓, 五台 系的 巖層 可分 爲 兩段最 下的名石 嘴 段; 共 上者名南台段; 砓

上 ΙĶŢ **両台段**。 Ϊ'n 日系的嚴層可分為兩段在下的名 資村段在上的名束略段這是專就地層 竹分

類。

中國地勢變溫小史

段 地層 既是代表 個時代我們不妨按地層的分類將五台南口兩時代分為若干 期:

歪 南 台 口 紀 紀 資村期 沰 南台. 西台期 東峪期 嘴 期 期 亞爾良時代 名肇生世

當 Ŧī. 台 紀的前二 一期中中, 國 ή'n 挴 陸 如 何分 配頗難 斷定。 因 爲 此 時所造的 巖層 中從未 鮝 見化

石, 不易比較在中國 南部除雲南 西部、 福建海濱及江西安徽一二 北方露頭的地方也, 處極古的嚴層尚 未 决 定 ÌÉ 肵 劚

東 的 年代外, 갦 艬 處。 似 到 南台 無 地 期 有發 的 末造, 見品 爾及紀嚴層的機會 海 底似略 有 起落, 如 im 五台 山 附近大約距陸 地不遠到 不過限於由 西 台 西、 期 河 初 北、 海 Щ 東 面 的 大

爲 爌 蕞, H 國 北部, 除 山 東 部 分 情 形 不 朔 m 外, 大半都 被淹沒川一 西 諸 地, Ħ, 沅 沒 在 西台 海 底。 到 五

台紀 興 萷 口 紀 滔 渡 的 時代中國的法 地盤發生劇 變海底陸地都有起跌因 為這樣激烈的 鼔 勤, 地 殼

Н: 现 許 多破 綻。 酸 性 的 巖 Ħ, 由 地 中 湧 Ĥ. 灌 入 已成 的 巖 石 一中間甚 至不 免有火山 【爆烈等情。

這 氼 地 盤 變 動以 **後**, 西、河 北 帶 都 脫 猱 海。 歷 時 敿 久, 山 西、 河 北 的 搟 勮 狭。 因為 據各 力 귮 考

察 ήŢ 結 果, 舸 口 紀 初 期 所 停積的 巖石 以土質 居多那就是來 自陸 地 居 多, 丽 搟 後 期 肵 造 的 巖 石,

形說, 灰質, 積於 大洋 中。 山 西、 河 北

在 東 北 褯 的 以石 灰質 的居 多按現今海中停積 的 怫 那 些石 地, 應停 Щ, 現今的 秦嶺 大 致 相 似。

雖 至 屬 前 汪 洋, 部, 非完全 丽 山東 爲 帶 大 陸, 仍 就 爲 是 陸 地。 陸 常時中國 地 而 兼 若 的 干 中 海 股海 部 亦 應為陸 灣。 現 在 的 東 南 海 岸 빓 東 以 南 仭 有 大 陸存 在。

戜

為高

興

通 過 南 П 時 代, 中 國 的 地 盤, 頗 形 安 定。 陸 地 受侵 蝕 不 已, 入 地 勢 敿 低。 海底 囚 馩 重 儎, 漸 有 下

隆 的 傾向。 然而 猌 全 體 m 論, **科無** 顣 著 的 變更 可 云。 直 到 舸 口 紀 將 要告 終, 海 底 起 Ī 波 折, 北 力ĵ 有 許

4 扯 方, 竟然伸 出 水 ÞĪ, 成了 陸地。 但此 次 (地盤的 鼓動, 遠不 及五台紀 未變 動 βij 影響之 大。 如 河 北 南

部 的 **遊鹿等處** 顯然 未 个 會 受過 此 次 變動 的 影響。 惟秦嶺 帶, 问 來為 中國 地 盤 構 造的 大 弱 點, 44

有 <u>tllı</u> 盤 的 變 動, 難 奼 不 受波 折。 所 以 南 口時代摧殘殆盡 的 中國 中 部 Βij Ш 脈, 劉南 口紀 <u>(1)</u> 末 造, 恐怕

國地勢變遷小史

中

士

常這 個 川現象發生威烈士和 時候地球上的氣候至少有幾處很冷那威澳大利亞南非洲都 有 йk 海冰 痈 搲 徙。 中國

國之所 中 褯 也有 以發生冰川現象是因為地球全體 冰 勃拉克韋特會在宜昌峽 的 氣候變冷 妮, 是因 口 南 為中 i e 地 部 方宥 有 藠 見冰 山 . 發生, 川的 丽 遵迹。 成為 那時 利! 中

洲 的 M 爾 魄士(Alps)山| 樣的 7冰流呢這個問 問題在科學上有重大的關係非有一番詳細 的 考

我 們 不 妏 輕 下断語至 若中國 北部似乎氣候極為乾燥嚴石腐壞產生與近 ?代所謂 laterite 相 類

似之紅 七剝削旣久陸地漸歸平坦在這種情形之下當然侵蝕的:, 力量 也甚舒緩由此以往就 漸 獑

近寒武紀了

寒武紀至奧陶紀中國的地勢

寒武 紀到與 隃 紀的地層中國北部和西南部發育最歷其中所產的化石亦多所以 我們 可以

據生物種類的分佈與世界各處寒武與陶紀的嚴層比較雲南: 方 面寒武奧陶紀的 鼹層 | 雖合化|

成 而 (者近於 那 方面 的 平列或者傾斜極緩自上至下層疊不紊故最適於地層學上的研究所以一 `地質構造頗不簡單考求層序不無困難之處北部則不然這方面寒武與陶紀的巖層` 羅 伷 斯、 勃 拉克

章特諸氏在山東一行得了許多有價值的結果。

揻 各方面 調 查的結果中國北部的寒武與陶紀嚴層可概分為三段上段為筍石灰嚴層 中段

爲 粒石 灰 嚴 層; 下段為饅頭 頁巖 層就嚴質而論下部多泥砂質愈至上部石灰質愈多到最上段純

粹為石灰質或鎂 灰質的材料 造成道三段巖層展 布的 地城都甚廣例如最下的饅頭段在山東 西

部以及河北 山西都有代表而中段的 粒石 灰巖, 不獨南見於江蘇的崙山東 北邊 满洲、 高麗 m A 濽

伦爾 (Toll) 的調查在西伯利亞一帶也有這種粒石 1灰巖的 代表但是關於道粒 · 粒石灰巖 石 灰 都是屬 嚴 我 們 於上 有

件應 段。 矛 心注意的事] 過上段的 粒石 那就是上段中有時也夾粒石灰巖例如唐山秦皇島附近的 [灰巖彷彿盡是細粒 (oölite) 作成而中段的粒石灰巖粗粒 (globulite) 細粒

都 有。 上段 的 筍 石 灰 巖分 怖 更 廣。 在滿洲 東北各省 的 奥美國 紐約州 (New York State)的 黑河

段相當而見於皖北長江一 帶的與歐洲 波羅的海 (Baltic Sea) 附近的筍石灰

農相類。

雲南 雖未聞有筍石灰巖而漢西確有奧筍石灰相當的巖層李希霍芬在中國東南各省雖然

費了許多苦心然而終久未會發見確實的寒武與陶紀的嚴層李希霍芬的調查記 1.錄中雖有 時业

及此項嚴層在東南部的分佈然無化石可憑我們對於他的意見——或者惴度不得不取保守的

態度仔細考究李希霍芬的調查錄他似乎以為江西皖南的 Tahau 砂巖廬山板巖 Matsr 石

灰巖至少有一部與東北方的寒武與陶紀的巖層相當究竟當與不當還待考察比較,

中國寒武奧陶紀嚴層的分類及分佈大概是如此我們現在就這地層上的事實可以推測當中國寒武奧陶紀嚴層的分類及分佈大概是如此我們現在就這地層上的事實可以推測當

時海陸分配的情形這兩個時代所造的嚴層旣可分為三段然則三段嚴層代表什麼時期由古生,

物學上考究起來我們現在敢說:

上段代表

奥陶紀

中段代表

後寒武紀中寒武紀

下段代表

前寒武紀的後期

遣 個 地方現 在稍 有一 點問題發生原來本潘來 (Pumpelly) 初到 中國 調 查 地 質的時 候看

在 中 武 譋 多 作 的 地 地 酉, 層 都 見有一大段 顺 眷 東 北 (地層)受 西 南 Simian 褶 皺。 他就 式的 稱 槢 這褶數為 **数最為顯著他於是用** Sinian 式的 褶数俟 Sinian 的名 後 李 希 雹芬 耳 稱

逍 大段 地 層名曰 Sinisch 至此 Sinian 的名目由地質構造學的範圍裏搬家搬 到 地 層 揧

裹去了英國紀器 (A. Geikie) 將 Sinisch 譯為 Sinisian 中國譯為震旦一九〇三 四

年威 成 的。 烈士 中 間 **f**j 和 勃拉克韋特在中國調查的時候見李希霍芬的震旦 極 題 著 的 一間 斷, 間 断所 Æ 的 地方就, 在饅頭 頁嚴底下據物拉克韋 |系的地層有地方 / 幷不是 炸 的 觀 察, 氣造 在 Щ

康 西 部 饅 90 頁巖 直 覆於秦 山 雜 殿之上; 而勃拉克韋 特 在山西 曾遇見十三處饅頭 頁嚴 與 其下

古的 巖 石 相 接觸這十三時 處之中有九處明 明白白 表示饅頭 層與其下 較古的巖石不整合 的 情

其餘幾處都是因地層 衝斷的接觸原來的關 係不明同時他們在饅頭段中發見了許多前寒 武 籷

的 石, īfii 狂 饅頭段以下的巖層 絕無化石 可睹所以威烈 士 和勃拉克章特 以 為李希 霍 茅 的

系宜 加 以 限 制。 於是將饅頭段以下的巖層 |動歸南| 口 1系而以饅 頭層 的底為震旦 || 案的 底世

十八

界 克韋 **巖成不整合之狀不過範圍似不甚廣,** 那 間 就是我 斷。 Ŀ 所以 的 特 有許 地質家將要承認這個辦法近來美國萬利普教授(Prof. 他 去年在皖北懷遠地方也曾目擊與陶紀的筍石灰嚴與其下的寒武紀或與陶紀的 逗 多 爲時機已經成熟, 地 方寃 枉了 李希 霍芬。 現在寒武紀 他并在 也許是一個局部的間斷在雲南方面戴 唐山、 與與陶紀可以分家了對於這個問題, 秦皇島附近 的 Grabau)叉發生 與陶紀縣 石 中發 異議, 我也 見了 可賛一解。 生 以為 物 攀的 石 灰

與寒武的巖層時呈不整合之狀。

普近

也會

見過

爽陶

紀 的 殿居

張, 所謂 澢 妡 爭有 與陶紀嚴層與寒武紀嚴層間的 寒 九 閫 名 紀 JF. 當的 ΙĶĴ 僻, 我 巖 們讓 理 層 曲。 旣 然 他 但是是否 死了 可 典 殊 臾 有充分的理由是否有· 爲 恟 μſ 粃 ||周断|| 惜。 ľij 嚴層 他所 災害 分家, 到底是一種什麼情形我們還不知道第二 震旦 張 以 :必要我卻 系 Sinian (的名 Ħ 自然 不 的 **- 敢遽然發言**。 名日名南 不適用了葛利 11 1頭一個 系 的 巖 呰 疑 層。 教 授 佌 點, 的 就是 就 以 主 是

查的 紀的 A 嚴層 個 |難題第三層| 和 寒武紀的嚴層往往 震旦紀這個名目經威烈士和勃拉克韋特訂定以 不產化石巖質相 似倘 岩無暫時公共的名目不免 後已經 為世 茅 給實 地 地 調

層

公認, 他 換 個 去更换難免不發生誤會混雜這個名辭已經受了幾次的虐待我看 地 位, 他又受一 番 虐 侍; 不 如 讓 他 慢慢的 就能了雖然最後的決定不在空論遠要 我 們 典其 (愛情他) 再把

潜將來中國的地質學的發展何如我們的主義,

總是擇其善者而從之。

中部 秦嶺 當寒 武 帮仍是陸地彷彿成 紀開幕的 時代, 中國 股 的 形 大 ĤJ 陸 半 在 島。 南方。 其

使入水不甚深就是山東的高地也漸成海底這

餘各處

都在海裏不過那

時

的

海

洋

初

由

西

南

方

個海名饅頭海與印度北部澳大利亞的海直接

相 通因為這些地方的海水 Redlichia 還有其 餘 有血 中都生 族 的 有 關 倸 族三 的 生 物。 葉

這個饅頭海與歐洲的前寒武海交通頗形隔絕。



寒武奧陶紀中國之地勢

當時 西伯 利亞 的 西 部也是大陸所以歐洲海裏的生物不易跑到東方來。

到寒武 紀的 中期歐洲 的寒武海由大西洋 力 鲌 向東 方前 進; 時亞洲的寒武海 由東南方向

西 北方前進中國境内的海水漸深於是海境大開外來的生物繁殖三葉猶占 L勢力。 奥 北 美 哂 部 打

成 一片而成一生物區域 Dorypyge, Ptychoyaria, Agnostus, Drepanura 等等三葉 痽 此

生物區域隨在皆有據華爾可脫(Walcott)的研究在中國 Dorypygo 生存的時代 也可

說是繁殖的 時代與歐洲 Paradoxides | 稱雄的時代相當這時海面雖然擴張而秦巓一帶仍超

出水面 因為 秦嶺 的正脈中據許多地質家的調查絕無寒武紀的嚴層秦嶺褶皺甚多適於保存地

層; 丽 寒武 紀的 巖層 不 獨富於化石幷且嚴質特別照這樣看來奏嶺中 如曾有寒武紀的 嚴層 **發生**,

不致至今日還沒有人看出我們所以敢信秦嶺 Ī 脈所占的 地面未 曾沉沒於寒武 海

由 寒武 紀的初期至奧陶紀的中葉中國的寒武海中極形安靜海陸分配的 情形 亦 椞 瘞 遷。 及

近奥陶 紀的 後期各處海底似乎稍有起有跌起跌較著之處甚至有出水面者如皖北懷遠及雲南

東部各處都有大洲小島羅列糾紛。

當與陶紀的時候中國海中的生物華顯然分爲兩派南派與歐洲同時的生物接近以Ortho-

以從生物方面研究起來我們也不能不信當奧陶紀時中國中部有一帶陸地隔斷南北部海洋的 與 同時的生物相關甚爲密切以 Actinoceras, Maclurea 等族爲特色 Actinoceras 極爲繁殖恰 ceras, Discoceras, Cyrtoceras, Graptolites, Trinucleus, Asaphus 交通那時的秦嶺我們不妨稱爲古秦嶺。 北美的黑河時期的情形一致兩派生物學的領地分界之處大致與現今的秦嶺地域相符 等族為特色北派與 北美 合。 所

志留紀至泥盆紀中國的地勢

採 |數十年來地質家及鑛業家在中國北部考察開掘的結果這一塊大地方絕無志留紀 與泥

盘紀的 而中國南部則正與北部相反這兩個時代所造的嚴層頗為完備并多含化石以表示

他們所屬的年代。

中國地勢變滅小史

部 雖 無志留紀及泥盆紀的巖層而西 北方如 南山 帶據與勃洛奇的調查有 紅 色絲

色的 板巖及石 「灰巖其· 《中產泥》 盆紀的化石又有石英變嚴結晶石灰嚴及其餘變形很深的 鮾

石奥勃洛奇疑為志留紀的代表。

中部 的 南面 那就是川陝毗連的地域李希霍芬曾發見若干種志留紀及泥盆 紀的

海洋 生物顯然表明那裏屬於道紀的嚴層都是成於海中不獨川北有這兩紀的嚴層繞著四 Jij 赭

盆的 西北及西邊大都有泥盆紀的巖層在川西的泥盆紀巖層與其下較古的巖層之間, 似有 閪

發生但其上部與葭蓬紀的嚴層似屬一貫四川赭盆的東邊有一段綠色頁巖名新攤頁巖據

威烈士和勃拉克韋特的調查這段嚴層在奧陶紀巖層之上葭篷紀巖層之下所以他當然應代表

志留 紀 ⋾ 泥 盆 紀但是安本旦農 (Abendanon) 以為新灘頁巖並不在葭獎與奧陶 展層之 間。 這

問 題 非再以實地考查我們不能給他一 個解決。 據我看起來威烈士和勃拉克章特的 意 莧; 不致

大不 對 的 地 方至若我的理由現在沒有時 問說出四川赭盆的 [東南方彷彿也有泥盆紀的

遺樣看來四川赭盆的週團斷續都有泥盆紀巖層的露頭。

搬層至少似有兩段一段是粗質砂巖一段是鎂石灰巖這兩段的關係至今還不清楚。 否存在卻不敢說合各家在鄱陽湖畔皖南太湖畔南京與鎮江間觀察的事實長江下游的泥盆紀 至若長江下游各處有泥盆紀的代表了無疑義但是志留紀的巖層除鎮江附近的崙山外是

殿層處處都是由海洋式的停積物造成或為泥灰巖或為土質石灰巖與其下較古的巖石常『閩 西南各省如湖南貴州廣西雲南除雲南一省外志留紀的嚴層似乎不可多見至若泥盆紀的

断』相接。

完全一致最足為比較地層的標準的莫如幾種腕足類如 Spirifer Curvatus, S. Verneuili, S. lina, Alveolites, Aulopora 🕸 Undiferus, Uncites Gryphus 及若干種珊瑚如 道些生物亦會繁殖於歐洲的志留海中泥盆紀時中國海中的生物臺與歐洲泥盆海中的生物臺· Amplexus 及岩干種腕足類如 Merista, Strophmena, Pentamerous, Orthis Calligramma 中國志留紀時可稱為特色的生物在川北的海中為各種珊瑚如 Heliolites, Flasmopara, Favosites sphæriscus, Calceola sanda-

現 敄 們 Ш 歷史家: 的眼光來君 ӥ 上所述的事實當與陶紀的後期中國 :古秦嶺以: 北方都沉在海底 萷

入海底。 倜 海 就 是淹

巳說

過到

奥陶

紀將

要告終

的

時

恢,

中

部

的

山

脈

那 就 是 我 們 肵 謂 ΗJ

及

南山

帶

至少有一部分也沉 這 没歐

地域, 美各大陸的志留海 大概是從北方各省的南部起到, 的一部分他在中國所 流域 占的

再由 Щ 西 |到雲南| 再西 南 间 交趾、 糆 餇 擴展。

常 胩 大 陸, 大約 Æ 中國 竹 東南 方。

志留 紕 將 行告終世界上出 了大事在; 歐洲

動蘇格蘭 發生了劇變名略利 典 道尼 構造大部分是這次變 (Caledonian) 大陸 穟


和瑞

那

威的

助 'nj 結 果北美 也有變動大致同時名曰大可尼

(Taconian)大陸變動我們 亞洲 也沒有逃脫這



泥盆紀至葭蓬紀初中國之地勢

地 一般改革的影響但是在我們這裏的變動彷彿沒有在歐洲的那樣激烈然而時間較長中國南

力的 地盤 褲 插上 洛泥 盆海於是漸往東北進行貴州 湖 南各處的 陸 地, 因此漸 成 ---片 、
五
件
了
。

ΙŃ Jī 既是向 下落然則 北方 何 如? 李希霍芬以為常志留 糺 和 泥盆 紀的 胩 愱, 中國 北 方全在! 深

津之下所以沉; 精的 巖質 極 少。 我 們現 在不必舉出道種 說法, 種種 說不 通的 處所, 就單 從 地質 構 造

的 原則極積著想似覺可以解決這個問題我們都承認一個凸形的旁邊必有一 個凹形以為之副

歽 Ű 地繼漸漸下落的處所附近應有地盤隆起這樣說法, 方志留紀和沉盆紀的嚴層之所以不存在按這樣說下去中部奏橫 一面可以適合於地質構造的 原 厠, 地域, 面

帶

的

似乎 是一 個 起 落 的 樞 紐。

可

Й

說

朔

中

國北

自 從 逭 火 變動 以 後, 中國 的 地勢許 **久沒有什麽變更北**。 方的: 陸地受空氣下的 侵 蝕 漸 歸 平 夷

姷 力 (6) 海 中 巖石 愈積 愈厚地勢雖然許久未變而, 地文的 惝 形卻 漸漸 變更氣候 漸 漸 變熱, 陸 地 植

物發生 海裏的生物羣也漸漸變換了於是東亞和其餘世界各地一樣成了一個極大的造煤廠。

葭蓬紀至二疊紀(煤紀)中國的地勢

葭蓬紀和二疊紀的巖層遍布中國全國這些巖層中所產的化石也不少就他們的巖質及所

含的 化 石的 種類而論中國煤紀的巖層可分為三式在北方的大半都屬大陸式所謂大陸式就是

殿石 的 原料, 是直接由大陸上送到淺水裏的或者是停積在大陸上的 如砂礫泥土植物等類物

在南方 的 大 都屬於海洋式所謂海洋式者就是發生於深海中的嚴石, 如石 ·灰巖等類: 北 方大陸式

有 m 殿層 絕對 的區別至於秦嶺長江流域以及南山一帶的煤紀嚴層大陸式與海洋式似無輕重之別可 中有 時夾有極薄的海洋式的巖層; 而海洋式的巖層中有時也 夾有 大陸式的 巖層幷不是

以視爲混合式。

北 方大陸式的巖層直接覆於奧陶紀或寒武紀石灰巖上大概可分上下兩段上段純 曲 砂巖

質嚴及煤層造成下段由砂巖質巖煤層造成下段與上段不同的地方就是下段中間夾著若干層

葭逢紀早坂於二年前發表意見說這些嚴層當屬於葭蓬紀的最後期。 cf. globulina 等等化石以為他們與歐洲的 Vise 石灰巖相當劃歸前葭蓬紀 Girty 因為那 些海洋式的巖層中含有 Squamularia cf. perplexa, Chonetes aff flemingi, 應該屬於後 他們所屬的年代至今還沒有定論 Brech 因為那些海洋式的嚴層中夾有 Productus semi-石灰巖或者他樣的停積物中夾有海洋生物的遺骸這兩段巖層中雖然出了許多化石然而關於 reticulatus, P. longispinus, P. giganteus, Spirifer duplicicosta, S. bisulcatus, Naticopsis

奪中的關係說中國煤紀的植物化石層應屬於二疊紀的初期甚至有人以為沈克 (Schenk) 氏 teris multinervis, Lepidodendron gaudryi, Calamites cf. leioderma 都不一致有的以中國煤紀巖層中的植物羣屬於後葭蓬紀有人 (葵拉 Zeiller) 因為 Taniop-在煤紀的時代無論世界何處都極繁盛關於已發見各種植物所屬的年代古植物家的意見許多 roptaris, Sphenophyllum, Megaytoris Cordaites, Calamites, Lepidodendron. 創劃權物 北方各處煤紀巖層中所產的植物化石種類極多最著的就是 Sigillaria annularia, Neu-等種植物雜在植物

所定的 Pterophyllum carbouarium 並非 Pterophyllum 乃是屬於中生世初期的一 族新

植物化 植物定名日 石的材料送給蘇勒教授 Tingia 古生物家的意見如此的分岐我們現在無從直甲曲乙好在現在已有許多 (Prof. Halle) 研究許多動物化石的材料則送給萬利 普研究。

就 現在 我們所知道的事實說我們不妨暫定北方煤紀的巖層為中葭蓬紀到二疊紀的代表。 北方

 $\overline{\mathbb{G}}$ 積如此之大各處地層發育容或有先後的差別所以各處煤紀嚴層所代表的時代不必完全

致讓我看來 Fusulinide 族的化石將來關於考究煤紀巖層的年齡必甚重要北方煤紀巖層所。

夾的石灰層不含這類化石的甚少單這一件事實已經表示那些石灰巖層中缺少前葭蓬紀的代

表雲南東部的煤紀殿層據戴普拉調查的結果可分為三段

上段 火山巖及砂巖礫巖】

>……|| 概紀

下段 石灰巖砂巖煤層 中段 『Fusulina石灰巖』、

>…… 葭蓬紀

下段代表前葭蓬紀至中葭蓬紀(Muscovian)。中段代表後葭蓬紀到二疊紀的中葉上段代表二

中國全國歐洲的俄國小亞細亞埃及一直到阿爾魄士山一帶都有這族的化石。 概紀的後期。Busulina 和 Schwagerina 是中段中特有的化石他們的分布極廣不獨遍布於

長江下游各處之煤紀嚴層也可概分爲三段

上段 含煤页巖和砂巖。

中段 『Fusulia 石灰巖』

下段~石灰巖。

這三段嚴層就層位而論當然不能各與雲南的三段完全相同但是兩處的 Fusulina 石

daleia floriformis, Zaphrentis spinulosa, Syringopera ramulosa, Michelina 8p. 辛酸异 灰巖至少有一部分相當無可疑惑他們中間幷夾著許多化石下段中最著名的化石就是 Lons-

waaggeni, Productus Sumatrensis, F. longispinus, Lyttonia richthofeni, Richthofenia 雲南的中段一樣夾著許多 Schwagerina, Fusulina. 上段出 Reticularia lineata, R.

等 化 石。 與印度 北部 Productus 石灰巖中所 出的 化石 相類的地方極多。

曲 郭 西到川北據勃拉克韋特及李希霍芬的調查有一段極 厚 ΗŢ 石 灰巖勃拉克章特

山 石 灰巖. 巫山石灰巖在新灘頁巖之上幷且產若干種化石表明他代表煤 紀。

其餘露煤紀巖層的地方極多今天時候太短祇好留在將來慢慢的研究。

中國 北 部煤紀層巖之上還有一 段缺少化石的砂巖名曰煤上砂巖(Überkohlensandsten)。

断定他的年代南 按 他 的 層位 說, :方也有與煤上砂巖相當的巖層但是他的巖質和 應代表二疊紀到三 一疊紀的 過渡時代然而至今還沒有發見化石我們不敢 他展布的情形 不甚 明 瞭。 湖南 十分

瀏陽附近以及皖南寧國等處似乎有這項嚴層露出。

梑 據以前所說的事實及其餘地層學上的事實我們現在可以追尋煤紀時中一 团 地 勢變 更的

情形當葭蓬紀的 前, 西部; 初期中國北方仍是一塊大陸植物叢生地形極為平坦這塊大陸的海岸線, 再東南 北麓往東京 方延展。 那時古秦嶺早已被侵蝕力削平了固無 由蒙

古往 所 經過 現 甘肅 在所說的 秦嶺不過單指地域而言由此以南前葭蓬紀的海沿四川的東南經湖南貴 繞秦嶺的

州 鄠 庭 m 入於雲南在這方面海井不甚深因為這方面屬於前葭蓬紀的停積物大半 都 是由陸 地

送 來 的, 杌 Æ 砂煤質等類。

间 東 (北方擴張) 葭 逄 紀 的 於是自泥 海 面在前述的情形之下并不甚久到前葭蓬紀的末期即莫斯科。 盆紀以 來的大陸竟被他 淹沒了這時中國 祀 部又 同 寒烒 期之初海, 舆 隃 紀的 面斯

樣成了一片汪洋。

性

ΗJ

艖

7-

由

地

Ħ,

四

中國

的

西

由南

山以

至

雲南

原

在前

腹蓬

紀的

海

因

此

次

暴

昂

出

莫斯 科 期 方欲告終中亞大陸起了 1方送出。 部, 地質的革命致地層折皺破裂火山 暴動酸 底。 性中 性以 働, 及基

水 Mi . 冲亞 的 鼓 動 雖 如 此 激 烈, 丽 中 阈 的 東北 部彷 狒 木骨 受何等的 影 **響。** 選 溡 已到 r‡1 葭 蓬 紀 的

造。 中國 西 部方 出 水 面, 陸沉 於是西藏島以 東 又成. 深海, 深洋 的 生物 加 各種 Foraminifera

得以 Ĥ Щ 繁殖。 此 所 Ľ, 有 Fusulina 石灰殿之生長, 這次 地 勢 的 改 革 不獨 限於 中 强, 舡 是東 半球

仝 球, 也 育.. 在 遣 個 车 命 的 漩渦 中。 逭 Ð 革命 ŔJ 結果, 就 是將 歟、 湿、 |非 大 陸 分為 葋 北 兩 大 陸。 北 大 陸名

歐 55 大 陸, 闸 大 陸 名 (FI) 非大 (陸) |古 地中称 横斷其間所 謂 7: 地 |中海者 就是 141 現今 Àij 地 11-1 池 以東, 鋞

過 小型 細 的海。 姫 波 斯 北 部、 印度 北 部 直 到 中 的

地中 衝 的 部選 迹地質家號稱這次變更為赫 Æ 竹 地 中 海 就 是這 個 很大店

個

長

形

(Hercynian) 大陸改造。

围 梯辛尼大陸暴動的結果世 界各處的地

北 勢 方各處草本繁殖速生速滅堆積 都住了變更暴動的餘威, 時未 止。同 成煤。 時中 妣 水 底 亞

時有起落而變成深 海 的 時期, 至 多 不過 五六次;

A

爲時

欧亚夫唑

Hercynian 改造後中國之地勢

甚短到了二疊紀 以後海洋乃完全退 田 北 部東南各省因之發生了許多海灣海岔在這

些

動。 ří 前 遏 妆 說 的 岔 "震旦式褶皺(Sinian folding) 恐怕是這回造成的因為這回運動火 裏又停積了許多煤層於是延延展展到了二疊紀的後期中國全部又遭 八山爆裂雲南京 Ħ 猛 烈的 莱 邲, 運

湖北東南部山東西部都有噴火口四川西部東南沿海各省以及湖南各處有花崗巖汁流出這 回

變動在中國地質史上可算得是一回大變故。

這次變動以後深洋退出中國南部北部發生內海湖沼於是深洋的生物再不能在中國生活。

死的死了跑的往西方跑了。

當時地球上各處的生物萃都更換頭面古生世的生物漸漸消滅中生世的生物起而稱雄。

二疊紀至株羅紀中國的地勢

中 生世所造的嚴層在中國全國以在四川赭盆中最為發育其餘如山東河北山西河南江西

地然無樣羅紀的嚴層至若貴州和廣西兩省大約這兩個時代的代表都有但是關於他們的, 各省雖都有株羅紀嚴層的小盆地然未聞確實有三疊紀的嚴層雲南東部雖有三疊紀嚴層的盆, 分佈

及分類至今我們還不清楚。

先說三疊紀的嚴層據戴普拉調查的結果雲南東部屬於這個時代的嚴層可分為三段下段

相似但是現在我們還未得著化石所以不能十分斷定。 算得是上段中特著的化石四川赭盆中的三疊紀巖層彷彿也可分為三段巖質與在雲南的大致 有的上段大半是砂泥質的巖石有時夾煤層 Trachyceras fasciger, Pseudomonotis plicatucrinus lilüformis 這些化石都是歐洲的中段三疊紀巖層中所常見的幷且是三疊系中段所特 loides, Lononema ef. subornata, Glossopteris inpica, Anomozamites inconstans 群游声 由砂巖泥灰巖而成其中夾 Myophoria, Anoplophora, Lingula matensis 大宇是石灰巖其中夾有泥灰巖和砂巖含 Myophoria elegans, Torquemia difformis, 等等化石中段 En.

爾附近一在桂陽開州附近福德勒在青海附近曾發見幾種三疊紀初期的生物如 與正的 表明那時中國西方的海還不淺。 |大洋停積物屬於三疊紀的在中國全國我們現在紙知道有兩處一在青海的庫庫路

中海的東部就是現在的中國到了三疊紀的初期古地中海的極東至少有一部分由海底隆起這 自從 赫 辛尼 大陸改造以來歐亞大陸在北印非大陸在南中間有古地中海隔斷這個古地

塊隆起的地盤恰好與現今的秦嶺及中國東部各

方川鄂問湖南贵州滇東的海灣隔絕北方的海愈省相當因為中部凸出水面所以北方的淺海與南

到東北愈沒愈到西北愈深。

到三疊紀的中期歐亞大陸稍有更換陸地往

北退海水隨之往北使所以那時東南歐的深海使

中國西南方常然受了這次變動的影響海變深了入德國而同時喜馬拉雅的深洋也往東北方擴張。

於是中段石灰質的巖石發生那時中國西南方的

抽 奥 徳 國 ſΚĵ 춰 屲 接 相 通 無 疑。 因為 兩處 的 生 物 椞

多植物鄂西、 都是 個樣子俟後深 觓 貴州雲南等處 仲 叉 往 西 ft/j 'n 煤層有 方退 Нį 旃 部分就是那時造 村, 海 岔、 湖沿之 類 成的。 自然發生在這些湖岔裏停積了許

Sonata de la contraction de la

株羅紀初中國的地勢

ιþ

阿地勢戀遷小史

從 茈 以 往, 北 方的 海向西 北方退南方的 海向西南方退不獨中國的 中部愈長愈高就是西邊

生長湖 杫 漸 淅 有許多地方伸出水 ΪΠ o 四川湖的 完積成煤大同務堂川北夔州等處的煤都是這個 **發生**, 大約從這 |時候起那時東亞的氣候特別宜於植 剘, 物 的

就是 誄 羅紀的 萷 期 作 .. 成 的。

裏淺海

裏都

有

腐爛

的

植

物

탉

那

那 ΠŤ !四 \widetilde{H}_{0} 是 僴 夫 鹽湖。 湖水漸漸汽化鹽質過爲濃厚所以沉下而 成顯層。 捌 水 iþi 所 Ŷ i),ì 鲢

類不 禠 **食鹽還有石** 膏等質所以我們今天往往發見石膏層與食廳層生於一 處。 **幷** 且就 層 次

隔很 近。

通 赳 株羅紀時中國的植物墓與四角利亞及斯匹次北爾根 (Spitzbergen) 之植 **一物薬關係**

梴 為密切。 Podozamites lanceolatus, Asplenium Whitbyenisi 等種類遜佈於西伯 利亞 页 及

中國 各處。 足以證明當時中國北方與西伯利亞及斯匹次 北爾根 都 屬 於 個 大陸。 庾國 有名 的 地

質家 直斯 (Suess) 稱這個 大陸為安加拉 (Angara) 大陸南 方的 大陸就是印度 群 的大 **(陸)**

戈杜哇那 (Gondwana) 大陸中間的海為古地中海。

株羅紀以後中國的地勢

洋停積物可轉。 時代之紀念以外從未聞有何項枯烈紀的層巖就現在我們的知識判斷中國本部決 的 海泉 株羅以後一直到今天在中國所生的地層極不完全就是那枯烈時代(一名白堊時代)歐洲 造了幾千尺厚的石灰巖和白堊然而中國除四川赭盆中多少有點淡水停積物以爲這 無那時的 海 個

許多哺乳動 砂巖這種砂巖不獨逼布於長江各省就是 流 域朝陽撫順等處的煤層有大部分屬於這個時代雲 至若新生世的停積物在中國已經發見的共有幾種那就是——(1)含煤層的泥砂 物 的化石中國人內來把這些化石當藥品用巧 北至甘肅蒙古南 南蒙白等處的也是屬於這 名之日 至廣東, [龍骨龍齒] 都有他 心的代表這家 據許 個 쓔 時代。 寒 裏邊發見了 (Schlose 巖遼河 (2) 紅

孔庚 (Koken)諸氏的研究這些龍骨龍齒大半都是 -更新 ب 期 的 生物遺 一酸有時 也有 員最

新 期 Ġij 结 物 遺 骸。 3 瀚 海層 分 佈於蒙古新疆、 甘肅各處(4)湖沼 停積、黄普拉曾在雲南東

安特 生 (Andersson) 臂 Æ. 山 两 前 部 (垣曲) 遇見這種嚴層。 (5)汶河礫殿勃拉克韋特 曾遇 見 追

種 巖 石 於 ţŢĮ 果 的 汶 泂 流域及河北的寧山盆 地。 $\widehat{\underline{6}}$ **黄土遍布於秦嶺以** 7 北除以 上所 舉 的 幾

種

停

馩 物以外還有大堆的 火山爆烈物張家口 外的 火山殿 流, 就 是最 著的。

溶然面 Ħ 從株羅紀 的未 造 中國 的 地盤 隆起後, 中國 E 經 成了 ___ 個 大 陸 國, 丽 北 雖 都 有 内 海 IJ 及湖

漸 獭 失 卻了 都 茅 技深。 崎嫗 芝 地形 象, 平均 那 肼 甚 H 囡 高, 室國, 歽 以 侵 可 蝕 算 得 Ήj 力量 個高 盐 烈。 原。 久之 直 梾 到 初 羅 新 糺 生 末 的宋期中國還 浩 所 造 的 Ш 岳, 是 如 秦嶺等等 個高

常 伙 14. 14. 原 _H. **7**j 洞 Ήi 湖 W_{a}

到 新 生 世: (Y_1) Ħ٢ 期 大約 是一 次 新 的時代世界又發生了地勢大革命歐洲發: 生 了 阿 爾

脈, 魄 就是我們今天所 Ш 版, ijţ. 影響及於 <u>(全</u> |敷。 亞洲發生了喜馬拉雅中國 猫。 的 笙, 本 部, 發生 兩 條 Ш 脈, 驱 鴪 74 騙。 這 枘 條 Ш

看

見的

秦嶺

闸

N

為這

桝

條

山

脈

發

艠

lίΙ, 西江 lf J 抗 域已經大概定了— 那 就 분 與 現在 差不 多了。 此 條 次 *變* 動, 大河 大 概 尳 著 發化。 是 ΗŢ 帞 到 方 這 來 耹 畃, 候, 崀 丒 爲 河、 此

所 造 的 山 脈大概都是由西至東這回革命影響之遠大決不亞於泥盆紀初的, 喀道利 呢 大 (陸改革、

煤紀中的赫辛尼大陸改造。

此 次 變 動 们 結果不僅是地面山川的改造就是內部的地層也生了許多很大的裂缝并且有

許 葋 多地盤 海岸 各 處, 陌 時時亦有巖汁火灰 落於是火山爆裂巖汁迸出蒙古南部展眼數千百里都是一片焦灼之象邃河以東東。 噴 ш. 不獨中國 如斯就是西北歐由英國西 北部 一直到 冰島(Ice.

land),也是火焰不息地力的運行可謂極一時之盛。

經 這 |大劇變之後中國的風| 景逈不如故北方除了幾個 淺湖以外都是平原或高 原, 葋 力 Щ 珢

水曲森林遍地所以性好原野的動物如馬類(Hipparion)都來, 楼息於北方而性好 第 濕、 森 林的

動 物, 如鹿豕之類繁殖於南方據許洛寨的研究他們的祖宗也許是由北美來的。

地 上的 變更不遑寧息新造的高山漸 被摧殘所生砂土都 轉到附近的 湖沿或海灣 裏去於是

紅 色]砂巖發生? 到了 — 更 新 ۳ 期的末造世界的 氣候慢慢的 變冷。 北美、 北歐, 兩雪較多的 地方, 成了

漫天漫地 的 冰雪世界中國 那 時的氣候何如, 類難斷言據我去年發見的幾件事實 推測 起來,

中國地勢變遷小史

三十九

抻 阈 的 氣 倾 也 |應是極冷北部幷有冰 加 流動但是這個問題究竟何 如, 湿 待 番 研究。

吹塵土 轉揚幾千百里於是秦嶺

自

從冰

期以

後人

類

漸

獑

進

多在生:

物

中 稱

雄因爲中國

扎

部 的

渖

慚 衚

涸 竭,

氣 俠 漸 獑

變乾風

以 這 種黄土今天還在轉移生長。 北大部分漸埋沒於黃土之下。

圆 Ħ) 地勢並不十分安定中 新生世中期大革命以後中 部的

長 П. 在 四 丌 赭 盆 的 東 部 向 地 缈

秦嶺恐怕還是繼

續的

隆


团

爲

起。

較 洗, 所以能穿過高地者必是先有 H'j 地方 流動, 水只能: 住 低 處

河 流 (fi) 後地 **面上昇河流侵蝕的**



第三期大改革後中國的地勢

中國地勢變遷小史

速率比 地面上昇的速率相等或較大所以水能流過其餘遺有許多同樣的證據表示地殼近世的

變惡現在我們不必一一詳論。

糝 觀幾萬萬年的歷史我們現在知道我們中國這一塊地皮並不是生來就是這樣的至 少經

過 幾次大改革我說大改革彷彿給人一個驟起驟落的觀念這個觀念是完全錯了我們要 知 道

兩百萬 年在地質家心目中只當尋常人心目中的一兩天或一兩月地質家的近世至少要與歷史,

家的 **—** 盤古』以前 相當所以就是過去時代有極快的變更決不是整個的山海忽然沒見了現在。

就 有許 多事實表示我們現在所居的時代就是一個地勢大改革的時代即此可想像過去大改革,

的情形何如。

我 場話雖然多少有點根據然而不過給 大家 **》一個概念可**認 惜我們所知道的地層 學 _Ĺ 的事

實太少不能把我們的討論弄得更有趣味若是嚴格的講起來我們中國地勢的 歷史還是黑暗的。

要把這個 過去黑暗的中國弄得大放光明那是全賴我們大家將來的努力。